

Kumulus® S

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt og bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

25 kg

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt og bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Undgå indånding af pulver/spray (P261).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i kernefrugt ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder (SPe8).

Må i bederoer ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 40 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtelefælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-34

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddisperserbart granulat (WG)

Svovl.....800 g/kg (80 % w/w)

Fast

FRAC:

GRUPPE	M02	Svampemiddel
--------	-----	--------------

Mindst holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

PR-nr.: 298442

© = Reg. varemærke for BASF



UFI: MC2W-R2ND-200S-2TY9



© = Reg. varemærke for BASF

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Virkningsmekanisme

Aktivstoffet i Kumulus S svovl virker både som kontaktmiddel og ved dampvirkning på visse svampesygdomme.

Effekter

Kumulus S har forebyggende effekt på meldug i forskellige kulturer og mod skurv i æbler og pærer.

Anvendelse

Kernefrugt:

Kumulus S anvendes mod skurv og meldug i kernefrugt. I kernefrugt anvendes tågesprøjter eller sprøjteudstyr med lodret bom. Afhængig af udstyr og træernes tæthed anvendes et volumen på 200 – 1000 L vand pr ha.

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Kernefrugt (æble, pære, kvæde, rønnebær og surbær (aronia))	Æblemeldug (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Æble- og Pæreskurv (<i>Venturia</i> spp.)	8 – 12 kg	Ved begyndende angreb Vækststadium 09 – 81	12 kg/ha (før blomstring, st. 09 – 59) og 8 kg (efter blomstring st. 69 – 81). Max 2 behandlinger. Maksimalt 4 behandlinger pr sæson ved præventiv behandling (6 kg/ha). Den maksimale total dosering må ikke overstige 24 kg pr ha pr sæson. Minimum 7 dage mellem behandlinger. Sprøjtefrist 7 dage.

Bederoer:

Kumulus S anvendes mod meldug i bederoer ved begyndende angreb.

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Bederoer	Bedemeldug (<i>Erysiphe betae</i>)	7,0 kg	Ved begyndende angreb i august/september Vækststadium 37 – 49	Max 3 behandlinger pr sæson og ikke over 21 kg pr ha pr sæson. Minimum 10 dage mellem behandlinger.

Der er ikke konstateret skader på afgrøden som følge af sprøjtning med Kumulus S, men Kumulus S bør ikke udbringes under meget tørre og varme forhold med kraftig solindstråling. Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde f.eks. som følge af tørke eller en ukrudtssprøjtning.

Resistens

For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Kumulus S indeholder aktivstoffet svovl. Svovl tilhører gruppen af multisite fungicider (FRAC gruppe M 02), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens.

Der er ikke konstateret vigende effekter af aktivstoffet overfor meldug og skurvsygdomme i Danmark.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Svovl har dog været anvendt mod sygdomme i adskillige årtier uden nogen nedsatte effekter er konstateret.

Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.

Blanding

Kumulus S kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

Sprøjteteknik

Kumulus S skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, o.l. Samtidig skal afdrift til omgivelserne undgås, særligt ved brug af tågesprøjter, hvor dråbestørrelsen er lille, er det vigtigt at vindhastigheden er lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet. Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt så hele planten dækkes og vandmængden bør tilpasses således at afdrypning undgås. Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

Ved brug af marksprøjter kan vandmængden variere fra 100-400 L/ha. Ved brug af tåge- og tunnelsprøjter eller sprøjter med lodret bom i frugt og bær kulturer, kan vandmængden variere fra 200-1000 L/ha. I frugt bør vandmængden dog altid tilpasses træhøjde og i mange tilfælde er en vandmængde på 200-300 L/ha tilstrækkelig.
En detaljeret vejledning med dyseforslag er tilgængelig på internettet, hos rådgivningstjenesterne eller ved kontakt til leverandører af sprøjter og dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Ved påfyldning af sprøjte skal der som hovedregel anvendes præparatfyldestyrt, dog er tilsætning direkte i sprøjtetanken på mindre og lave sprøjter tilladt.

Følgende anvisning for tilberedning bør overholdes ved brug af Kumulus S: Sprøjten fyldes $\frac{1}{2}$ op med rent vand, hvorefter Kumulus S tilsættes præparatfyldestyret eller direkte i tanken i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. For hurtig tilsætning af Kumulus S kan forårsage dannelse af svært opløselige klumper. Kumulus S tilsættes generelt som 1. middel. Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste. Der bør være konstant omrøring under påfyldning og kørsel, og udsprøjtningen bør foretages straks efter tilberedning.

Efter endt påfyldning skylles præparatfyldestyret samt tomme dunke/beholdere.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. Hvis udvendig rengøring ikke finder sted på den behandlede mark inden denne forlades skal sprøjten placeres på vaskepladsen eller under tag indtil rengøring kan finde sted.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark/plantage under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring

Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Produktansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Kumulus S (19-34) mod en række sygdomme i afgrøder angivet i nedenstående tabeller.

Miljøstyrelsen har godkendt disse anvendelser og vejledninger i hendhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Ansvar for vejledning i forbindelse med mindre anvendelse:

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke hidtil har været omfattet af godkendelsen

Vejledning til mindre anvendelse – eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen for mindre anvendelse følges.

BASF A/S og de ansøgende organisationer kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkninger, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt og den tilknyttede vejledning til mindre anvendelse i afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse

Advarsel:

“Se Kumulus S etiketten”

GartneriRådgivningen (4. maj 2018)

Vejledning for Kumulus S (19-34) mod svampesygdomme og galmider i kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben, vindruer og jordbær på friland.

Må kun anvendes mod svampe og galmider i kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben, vindruer og jordbær på friland.

Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Brugsanvisningens angivelse af skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetids punkt og sprøjtefrist skal overholdes.

Må ikke anvendes nærmere end hhv. 5 m for jordbær, 20 m for solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben og vindruer samt 30 m for kirsebær og blomme fra § 3 områder for at beskytte insekter og leddyr.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Kumulus S ikke anvendes i blomstrende af grøder.

På friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. sæson	Behandlingstidspunkt	Sprøjtefrist/PHI
Kirsebær og blomme	Kirsebærbladplet og blompepunggalmiden	Maks. 8 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 (7 dages interval)	Fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt frugtudvikling (BBCH 70-79)	1 dag
Solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og hyben	Meldug, skivesvamp, Phomopsis vaccinii (i blåbær), rosenstråleplet (i hyben) og galmider	Maks. 8 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 (7 dages interval)	Fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt frugtudvikling (BBCH 70-79)	1 dag
Jordbær	Meldug	Maks. 5 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 (7 dages interval)	Fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt frugtudvikling (BBCH 70-79)	1 dag
Vindruer**	Meldug	Maks. 5 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 (7 dages interval)	Fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt frugtudvikling (BBCH 70-79)	1 dag

** Tysk anbefaling til behandling i vindruer

BBCH 09 – BBCH 61 (fra knopbrydning): 3,6 kg/ha i maks. 400 l/ha vand.

BBCH 71 – BBCH 75 (fra begyndende frugtdannelse): 2,4 kg/ha i maks. 1200 l/ha vand.

Fra BBCH 75 (bærrene har ærtestørrelse og klaserne hænger): 3,2 kg/ha i maks. 1600 l/ha vand.

Risiko for skade: Kumulus S kan svide bladene ved høje doseringer og kraftig solindstråling. Læs også advarslerne på Kumulus S etiketten.

GartneriRådgivningen (4. maj 2018)

Vejledning for Kumulus S (19-34) mod svampesygdomme og galmider i prydplanter/planteskolekulturer på friland og i væksthushus.

Må kun anvendes mod svampesygdomme og galmider i prydplanter/planteskolekulturer på friland og i væksthushus.

Brugsanvisningens angivelse af skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval og sprøjetidspunkt skal overholdes.

Må på friland ikke anvendes nærmere end hhv. 10 m fra § 3 områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Kumulus S ikke anvendes i blomstrende afgrøder på friland.

På friland og i væksthushus

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. sæson	Behandlingstidspunkt (vækststadier)
Friland	Meldug, skurv, skivesvamp, kirsebær bladplet, lær-kens nålefelds-svamp (<i>Meria larii-cis</i>), rosenstråleplet og galmider	Maks. 5 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 Min 5 dages interval	Ved behov
Væksthushus	Meldug og rosenstråleplet	Maks. 3 kg/ha**	Maks 8 Min 5 dages interval	Ved behov

** 0,1-0,2 % (1500 L 0,2 % opløsning)

Risiko for skade: Kumulus S kan svide bladene ved høje doseringer og kraftig solindstråling. Læs også advarslerne på Kumulus S etiketten.

GartneriRådgivningen (17. maj 2018)

Vejledning for Kumulus S (19-34) til bekæmpelse af kartoffelskimmel i økologiske kartofler.

Må kun anvendes i økologiske kartofler til behandling af kartoffelskimmel.

Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Brugsanvisningens angivelse af skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra § 3 områder for at beskytte insekter og leddyr.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Kumulus S ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

Til anvendelse i økologiske kartofler

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. sæson	Behandlingstidspunkt	Sprøjtefrist/PHI
Økologiske kartofler	Kartoffelskimmel	Maks. 6 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 6 (5 dages interval)	Ved behov	1 dag

Risiko for skade: Kumulus S kan svide bladene ved høje doseringer og kraftig solindstråling. Læs også advarslerne på Kumulus S etiketten.

HortiAdvice (14. februar 2019)

Vejledning for Kumulus S (19-34) mod meldug i jordbær i væksthuse

Må kun anvendes mod meldug i jordbær i væksthuse.

Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Brugsanvisningens angivelse af skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, sprøjetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.

Til anvendelse i væksthuse

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. sæson	Behandlingstidspunkt	Sprøjtefrist/PHI
Jordbær	Meldug	Maks. 5 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 Min 5 dages interval	Fra knopbrydning til frugtdannelse (BBCH 59-79).	1 dag

Risiko for skade: Kumulus S kan svide bladene ved høje doseringer og kraftig solindstråling. Læs også advarslerne på Kumulus S etiketten.

HortiAdvice (7. februar 2022)

Vejledning for Kumulus S (19-34) mod meldug og rosenstråleplet i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

Må kun anvendes mod meldug og rosenstråleplet i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Ved anvendelse i planter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne skal stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur).

Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning, for at beskytte bier.

For at beskytte bier, må planter behandlet under blomstring først udflyttes efter afblomstring.

Anvendelse: Mod meldug og rosenstråleplet i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. hold (interval)	Antal behandlede hold pr. væksthuseareal pr. år	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på tætte borde med recirkulation eller på tæt bund med opsamling/recirkulation	3,0 kg/ha Svarende til: Max 150 liter 0,1-0,2 % opløsning pr. 1000 m ² ha* (= max 3 kg/ha)	Maks 8 (Min 5 dage)	Der sættes ikke en begrænsning så-fremt bordene er tætte og der er re-cirkulation	1 dag. Planter behandlet under blomstring må først udflyttes efter afblomstring.
Prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter på jorden. Potterne skal stå så tæt som muligt			Der sættes ikke en begrænsning så-fremt der er pottetæt kultur.	1 dag. Planter behandlet under blomstring må først udflyttes efter afblomstring.

*0,1 – 0,2 % opløsning (= 100 – 200 g Kumulus S pr. 100 L vand)

Sprøjeteknik:

Sprøjter med horisontal sprøjtebom og sprøjter med lanse

Risiko for skade:

Kumulus S kan svide bladene ved høje doseringer og kraftig solindstråling. Læs også advarslerne på Kumulus S etiketten. Ved anvendelse af Kumulus S i nye kulturer eller sorter, bør det afprøves på et mindre antal planter først. Herved fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.

Økologi:

Kumulus S kan anvendes i økologisk produktion.

HortiAdvice (25. juni 2021 Opdateret 21. august 2024)

Vejledning for Kumulus S (19-34) mod meldug i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland.

Må kun anvendes mod meldug i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland.

Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må på friland og tunneller på friland ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte insekter og leddyr.

På friland og tunneller på friland: For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder.

Til anvendelse i åbne væksthuse samt på tabletop på friland eller i tunneller på friland.

Afgrøde	Skade-volder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. sæson (interval)	Vandmængde	Behandlingstidspunkt	Sprøjtefrist
Jordbær dyrket i render i åbne væksthuse	Meldug	Maks. 5 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks 8 behandlinger pr. år på samme areal (Min 5 dages interval)	200-1000 L/ha	Fra knopbrydning til frugtdannelse	1 dag
Jordbær dyrket på tabletop på friland eller i tunneller på friland	Meldug	Maks. 5 kg/ha Den totale dosering må ikke overstige 24 kg/ha pr. sæson	Maks. 8 behandlinger pr. år på samme areal (Min. 7 dages interval)	200-1000 L/ha	Fra knopbrydning til frugtdannelse	1 dag

Sprøjteteknik:

Sprøjte med vertikal sprøjtebom eller rygssprøjte til bl.a. pletbehandling. Dyserne på den vertikale sprøjtebom skal være indstillet således, at sprøjtevæsken kun rammer planterne i rækken. Ved brug af rygssprøjte skal al sprøjtevæsken afsættes i afgrøden.

Risiko for skade: Kumulus S kan svide bladene ved høje doseringer og kraftig solindstråling. Læs også advarslerne på Kumulus S etiketten.

Økologi:

Kumulus S må anvendes i økologisk produktion.

Vejledning for Kumulus S (19-34) mod galmider i juletræer og pyntegrønt kan fås ved henvendelse til:

Danske Juletræer – træer og grønt, Blokken 15, 3460 Birkerød.

Kumulus® S

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt og bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

25 kg

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kernefrugt og bederoer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Undgå indånding af pulver/spray (P261).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i kernefrugt ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder (SPe8).

Må i bederoer ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 40 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-34

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)

Svovl.....800 g/kg (80 % w/w)

Fast

FRAC:

GRUPPE

M02

Svampemiddel

Mindst holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.
Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V.,
Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

PR-nr.: 298442

© = Reg. varemærke for BASF



UFI: MC2W-R2ND-200S-2TY9



© = Reg. varemærke for BASF



81191131 DK 2066



4 014348 741248