

Scala®

**EASY
CONNECT**
www.easyconnect.tech



Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

5 L



® = Reg. varemærke for BASF

81190673 DK 2056



Førstehjælp

Forurenet tøj tages af og vaskes før det bruges igen (P362).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen (P304+P340).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P303+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden (P330).

Ring omgående til GIFTLINJEN eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Virkningsmekanisme

Scala er et kontakt og lokalsystemisk svampemiddel, der påvirker svampens enzymesystem. Aktivstoffet pyrimethanil tilhører anilinopyrimidin-gruppen, som blokerer udskillelsen af enzymer der er nødvendige for en svampeinfektion. Herved hindres eller stoppes infektion processen.

Effekter

Scala har god effekt på skurv (*Venturia inaequalis* og *Venturia pirina*) i æbler og pærer samt effektiv forebyggende effekt på gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i jordbær.

Scala er særdeles velegnet til de første sprøjtninger, idet der kan opnås gode effekter fra 5 °C og opfejer.

Anvendelse

Æbler og pærer

I æbler og pærer anvendes Scala fra vækststadium "grøn spids" til "afsluttende blomstring". Anvendes Scala på et senere tidspunkt bør det altid ske i blanding med et produkt med en anden virkningsmekanisme i fuld dosering f.eks. Delan 700 WG.

Afgrode	Skadevolder	Anvendelsesstadier	Dosering/ha
Æbler Pærer	Æbleskurv Pæraskurv	"Grøn spids" til "afsluttende blomstring"	1,1 l
		Senere vækststadier	0,75 l (+ fuld dosering Delan 700 WG)

Der må maksimalt anvendes 4 behandlinger med Scala pr sæson i æbler og pærer.

Der må ikke arbejdes i æble- og pære kulturer før 1 døgn efter behandling med Scala (re-entry).

Jordbær

Jordbær behandles i blomstringsperioden. Scala anvendes med 1 sprøjtning, når der udføres 2 – 3 gråskimmelbehandlinger. Udføres der 4 – 6 gråskimmel-behandlinger anvendes Scala 2 gange, dog ikke i rækkefølge.

Afgrøde	Skadevolder	Anvendelsesstadier	Dosering/ha
Jordbær	Gråskimmel	Under hele blomstringen	2,0 l

Der må maksimalt anvendes 2 behandlinger med Scala pr sæson i jordbær.

I jordbær skal der anvendes afskærmet sprøjtning ("jordbærbom") af hensyn til vandmiljøet.

Virkningstiden afhænger af smittetryk og plantetilvækst, men der kan forventes forebyggende effekt på 7 dage. Scala har en kurativ effekt på 2 – 3 døgn, længst under kolige forhold.

Resistens

Aktivstoffet i Scala pyrimethanil tilhører gruppen af anilinopyrimidiner (FRAC-gruppe 9). Ifølge FRAC er risikoen for resistensudvikling i denne gruppe middel, mens både skurv og gråskimmel tilhører gruppen af patogener med stor risiko for udvikling af resistens. Da antallet af midler til bekæmpelse af skurv og gråskimmel i Danmark er begrænsede, er det vigtigt at FRAC's anbefalinger for resistensstrategi ved anvendelse af midler med et aktivstof fra gruppen af anilinopyrimidiner følges. Denne anbefaler maksimalt 4 sprøjtninger i æbler og pærer og i situationer, hvor der på lokaliteten er mistanke om resistens, da kun i blanding med et andet effektivt skurvmiddel. I jordbær anbefales maksimalt 2 sprøjtninger hvis det samlede antal sprøjtninger er 3-6, ellers kun en enkelt.

Blanding

Scala kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

Sprøjeteknik

Scala skal udbringes med en sprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, o.l. Samtidig skal afdrift til omgivelserne undgås, særligt ved brug af tågesprøjter, hvor dråbestørrelsen er lille, er det vigtigt at vindhastigheden er lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet. Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt så hele planten dækkes og vandmængden bør tilpasses således at afdrykning undgås.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

Ved brug af tåge- og tunnelsprøjter eller sprøjter med lodret bom.

I kernefrugt kan vandmængden variere fra 200-1000 L/ha. Vandmængden skal dog altid tilpasses træhøjde og i mange tilfælde er en vandmængde på 200-300 l/ha tilstrækkelig.

Båndsprøjtning

I jordbær på friland anvendes båndsprøjtning således der kun sprøjtes i rækkerne. En såkaldt jordbærbom, der dækker flere rækker ad gangen, er særligt udbredt. Vandmængderne kan variere fra 200-1000 L/ha.

En detaljeret vejledning med dyseforslag er tilgængelig på internettet, hos rådgivningstjenesterne eller ved kontakt til leverandører af sprøjter og dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Ved påfyldning af sprøjte skal der som hovedregel anvendes præparatfyldeudstyr, dog er tilsætning direkte i sprøjetanken på mindre og lave sprøjter tilladt.

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjetanken.

Efter endt påfyldning skylles præparatfyldeudstyret samt tomme dunke/beholdere.

Tilsættes Scala direkte i tanken (f.eks. mindre tågesprøjter) skal det ligeledes ske i en lind strøm samtidig med god omrøring i tanken.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen.

Hvis udvendig rengøring ikke finder sted på den behandlede mark eller plantage inden denne forlades skal sprøjten placeres på vaskepladsen eller under tag indtil rengøring kan finde sted.

Større sprøjter skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark eller plantage (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan. Emballagen må ikke genbruges.

Lagring

Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Produktansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i prydplanter i væksthuse og på friland inkl. Planteskolekulturer

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse – eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Der gøres opmærksom på, at anvendelsen til den mindre anvendelse sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår effektivitet og fytotoksicitet.

Vejledning og brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i prydplanter i væksthuse og på friland inkl. planteskolekulturer

Advarsel:

Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og brugsanvisningen skal følges. Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Virkemåde:

Scala virker både som kontakt- og lokalsystemisk middel.

Optimale virkningsforhold:

Temperatur: min. 5 °C

Timers tørvejr: 1

Brugsanvisning

Anvendelsesområde:

Scala må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel i prydplanter i væksthuse og på friland inkl. planteskolekulturer.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Scala anvendes ved risiko for angreb.

Bør ikke anvendes mere end 3 gange pr. kultur.

Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m til vandmiljøet (søer, vandløb, mm.), ved anvendelse af alm. bomsprøjt i lave kulturer, for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 30 m til vandmiljøet (søer, vandløb, mm.), ved anvendelse af tågesprøjt i høje kulturer, for at beskytte organismer, der lever i vand.

Dosering:

1. Maks. 200 ml Scala pr. 100 l vand (~0,2%). Der må maksimalt anvendes hvad der svarer til 2,25 l Scala pr. ha kultur.
2. I høje kulturer, hvor det er nødvendigt at bruge tågesprøjt, må der maksimalt anvendes 1,1 l Scala pr. ha.

Tålsomhed:

Scala har et højt damptryk og kræver derfor grundig udluftning af væksthuset efter endt behandling. Det skal sikres, at der ikke forekommer nedslag dvs. kondensering af vanddamp på planternes blade/blomster efter udsprøjtning af Scala. Temperaturen i væksthuset skal være svagt stigende, eller holdes konstant frem til udluftningsperioden. Det kan være en god ide at have blæsere/vifter tændt under behandlingsperioden for at sikre en jævn fordeling af dampen i huset. Udluftning skal påbegyndes, så snart temperaturen

begynder at falde. Skader, som følge af nedslag, viser sig som brune nekrotiske pletter på blade/blomster/frugter. Når nedslag undgås, kan Scala anvendes i en lang række kulturer uden risiko for skader. Scala har været afprøvet i Begonia, Margeritter, Cyclamen, Erica og Azalea, og planteskolekulturer med flere. Det skal dog anbefales, at den enkelte bruger foretager en prøvebehandling på et mindre antal planter, før hele kulturen behandles. Der kan være forskel i tålsomhed afhængig af årstiden, sorten, planternes ernæring o. lign.

Maj 2013

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i tomat, agurk og salat i væksthussamt i salat på friland

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen – Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse – eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Der gøres opmærksom på, at anvendelsen til den mindre anvendelse sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår effektivitet og fyto toksicitet.

Vejledning og brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i tomat, agurk og salat i væksthussamt i salat på friland

Advarsel:

Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og brugsanvisningen skal følges. Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Virkemåde:

Scala virker både som kontakt- og lokalsystemisk middel.

Optimale virkningsforhold:

Temperatur: min. 5 C

Timers tørvejr: 1

Brugsanvisning

Anvendelsesområde:

Scala må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel i tomat, agurk og salat i væksthus samt i salat på friland.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Scala anvendes ved risiko for angreb.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m til vandmiljøet (søer, vandløb, mm.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Salat i væksthus og på friland: Maks. 2 behandlinger pr. kultur med 4 ugers interval og ikke færre end 7 dage før høst.

Tomat og agurk i væksthus: Maks. 3 behandlinger pr. kultur med 4 ugers interval og ikke færre end 3 dage før høst.

Dosering:

Salat på friland: Maks. 2 l Scala pr. ha.

Tomat, agurk og salat i væksthus: Maks. 150 ml Scala pr. 100 l vand (~0,15%). Der må maksimalt anvendes hvad der svarer til 2,25 l Scala pr. ha kultur.

Tålsomhed:

Scala har et højt damptryk og kræver derfor grundig udluftning af væksthuset efter endt behandling. Det skal sikres, at der ikke forekommer nedslag dvs. kondensering af vanddamp på planternes blade/blomster efter udsprøjtning af Scala. Temperaturen i væksthuset skal være svagt stigende, eller holdes konstant frem til udluftningsperioden. Det kan være en god ide at have blæsere/vifter tændt under behandlingsperioden for at sikre en jævn fordeling af dampen i huset. Udluftning skal påbegyndes, så snart temperaturen begynder at falde. Skader, som følge af nedslag, viser sig som brune nekrotiske pletter på blade/blomster/frugter. Når nedslag undgås, kan Scala anvendes i en lang række kulturer uden risiko for skader. Scala har været afprøvet i Begonia, Margeritter, Cyclamen, Erica og Azalea, agurker, tomater, salat, planteskolekulturer med flere. Det skal dog anbefales, at den enkelte bruger foretager en prøvebehandling på et mindre antal planter, før hele kulturen behandles. Der kan være forskel i tålsomhed afhængig af årstiden, sorten, planternes ernæring o. lign.

Maj 2013

EASY CONNECT



Easyconnect-systemet kræver en kobling til brug.

Trin for trin instruktion til brug med kobling:

- Fjern støvdækslet Skub IKKE stikket manuelt ind i dunken!
- Vend dunken med easyconnect låget nedad og tilslut den til koblingen. Følg derefter instruktionerne fra din koblingsleverandør.
- **easyconnect-låget behøver IKKE at blive skruet af/på manuelt.**
- Efter fuldstændig tømrning og skylning kan du skubbe stikket ind i beholderen, hvis det er aktuelt at få resterende skyllevand til at løbe ud.
- easyconnect låget kan smeltes om til genanvendelse sammen med dunken i henhold til lokale regler.
- Bemærk: Når du bruger easyconnect-koblingen, skal du fortsætte med at bære personlige værnemidler i overensstemmelse med vejledningen på produktetiketten.



Du kan finde flere oplysninger om www.easyconnect.tech

Hvis du ikke har en kobling endnu, skal du bare skrue hættten af for konventionel påfyldning.

Trin for trin instruktion til konventionel brug:

- Fjern IKKE støvdækslet eller skub stikket ind i beholderen!
- Uden kobling kan easyconnect låg bruges på samme måde som traditionelle låg.
- Skru easyconnect låget af, og hæld væsken i induktionsskålen.
- **Bemærk:** Dette vil ikke udnytte fordelene ved easyconnect systemet.
- easyconnect låget kan smeltes om til genanvendelse sammen med dunken i henhold til lokale regler.

Scala®

**EASY
CONNECT**
www.easyconnect.tech



Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

5 L



Scala®

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-159

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Pyrimethanil 400 g/liter (37,4 % w/w)

Indeholder: 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Flydende

FRAC:

GRUPPE

9

SVAMPEMIDDEL

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S,

Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V.,

Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

® = Reg. varemærke for BASF







EASY
CONNECT

www.easyconnect.tech



Du kan finde flere oplysninger om
www.easyconnect.tech



5 L

Scala®

EASY
CONNECT
www.easyconnect.tech



Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



4x5 L

Scala®

EASY
CONNECT
www.easyconnect.tech




Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



4x5 L

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Svampemiddel nr. 19-159

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Pyrimethanil 400 g/liter (37,4 % w/w)

Indeholder: 1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Flydende

FRAC:

GRUPPE	9	SVAMPEMIDDEL
--------	---	--------------

Mindst holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

© = Reg. varemærke for BASF



(01)04041885294852

81 190675 DK 2056

