

Pico 750 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



0,5 kg

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (blodsystem). (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke pulver. (P260).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end BBCH 29.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyret nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Ukrudtsmiddel nr. 19-171

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)

Picolinafen..... 750 g/kg (75,0 %w/w)

Fast

HRAC:

GRUPPE

12

UKRUDTSMIDDEL

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V, Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

© = Reg. varemærke for BASF



UFI: H5N8-PKK5-V009-Y6H7



4 041885 409096

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Søg lægehjælp ved ubehag. (P314).

Nødtilfælde: Giftlinjen tf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Virkningsmekanisme

Pico 750 WG består af aktivstoffet picolinafen.
Picolinafen optages via blade og rødder og virker ved at inhibere carotenoid biosyntesen.
Carotenoid hindrer lysnedbrydning af klorofyl og når denne beskyttelse fjernes vil symptomerne efter en picolinafen behandling være afblegning af bladene.

Anvendelse

Pico 750 WG anvendes om efteråret i kornets vækststadium BBCH 11-12 eller i foråret vækststadium BBCH 25-29. Pico 750 WG kan anvendes alene eller i blanding med både jord- og bladmidler.

Fugtig jord fremmer virkningen, men Pico 750 WG bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Pico 750 WG nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode.

Efterår på fugtig jord efter eventuel tromling.

Afgrøde	Ukrudtsarter	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
vinterhvede, vinterrug, vinterbyg vintertriticale	Agersennep Alm fuglegræs Hyrdetaske Lugtøs kamille Burrnesnerre Agerstedmoder Rød tvetand Mark ærenpris Storkronet ærenpris Vedvend ærenpris	0,133 kg	Vækststadium 11-12	Ca. 2 uger efter behandling kan der særligt i vinterbyg ses hvide pletter, der dog forsvinder igen.

Der kan opnås moderat effekt på enårig rapgræs under gode vækstforhold.

Forår når væksten er i gang.

Afgrøde	Ukrudtsarter	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
vinterhvede, vinterrug, vinterbyg vintertriticale	Agersennep Alm fuglegræs Hyrdetaske Agerstedmoder Rød tvetand Mark ærenpris Storkronet ærenpris Vedvend ærenpris	0,133 kg	Vækststadium 25-29	Ca. 2 uger efter behandling kan der særligt i vinterbyg ses hvide pletter, der dog forsvinder igen. Sprøjtefrist 90 dage.

Der er ikke konstateret negative effekter på afgrøden efter brug af Pico 750 WG, man bør dog undgå at sprøjte på stressede planter f.eks. forårsaget af tørke eller manganmangel.

Efterfølgende afgrøder

Der er ingen restriktioner for valg af efterfølgende afgrøder efter normalt sædskifte. I tilfælde af omsåning anbefales en jordbearbejdning til 15 cm's dybde og for raps bør der gå 90 dage mellem behandling og såning. Vintersæd kan etableres uden særlig jordbearbejdning.

Resistens

For mange herbicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Pico 750 WG består af aktivstoffet picolinafen.
Picolinafen tilhører gruppen pyridincoboxamider (HRAC gruppe 12), og vurderes til at have lav risiko for udvikling af resistens.
Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens.

For generelt at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Blanding

Pico 750 WG kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

Sprøjeteknik

Pico 750 skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion. Den anbefalede vandmængde er 150-300 L/ha.

Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på den tilladte måde, så overlappning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.

Vindhastigheden bør altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Brug af afdriftsreducerende dyser anbefales af hensyn til vandmiljøet og omgivelserne i øvrigt og afhængig af dysetype vil man anvende et tryk på 2,0 – 3,5 bar og køre med en hastighed på 6,0 – 10,0 km/t.

En detaljeret vejledning med dyseforslag er tilgængelig på internettet, hos rådgivningstjenesterne eller ved kontakt til leverandører af sprøjter og dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Følgende anvisning for tilberedning bør overholdes ved brug af Pico 750 WG: *Sprøjten fyldes ½ op med rent vand, hvorefter Pico 750 WG tilsættes præparatfyldestyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. Pico 750 WG tilsættes generelt som 1. middel. Til slut fyldes sprøjten til det ønskede volumen samtidig med, at det sikres at midlet/midlerne er helt opløste.*

Præparatfyldestyret

Ved anvendelse af præparatfyldestyret påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjteanken. Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Pico 750 WG i fyldestationen.

Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udskrøjes under kørsel på det behandlede areal.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udskrøjes straks efter tilberedningen.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring

Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Produktansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Pico 750 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



0,5 kg

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (blodsystem). (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke pulver. (P260).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end BBCH 29.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

UFI: H5N8-PKK5-V009-Y6H7

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyret nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Ukrudtsmiddel nr. 19-171

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)

Picolinafen..... 750 g/kg (75,0 %w/w)

Fast

HRAC:

GRUPPE

12

UKRUDTSMIDDEL

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V, Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

© = Reg. varemærke for BASF



4 041885 409096

Pico 750 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



10x0,5 kg

Pico 750 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.



10x0,5 kg

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (blodsystem). (H373).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Indånd ikke pulver. (P260).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end BBCH 29.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Ukrudtsmiddel nr. 19-171

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart granulat (WG)

Picolinafen..... 750 g/kg (75,0 %w/w)

Fast

HRAC:

GRUPPE	12	UKRUDTSMIDDEL
--------	----	---------------

Mindst holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S,
Kalvebod Brygge 45, 1. DK-1560 København V.,
Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch,
8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

© = Reg. varemærke for BASF



UFI: H5N8-PKK5-V009-Y6H7



(01)04041885409102

81 189295 DK 2036