



Pico[®] 750 WG

Græsukrudt skal bekæmpes i efteråret

- ✓ Bekæmper både bredbladet og græsukrudt i vintersæd
- ✓ Effektiv i strategi mod agerrævehale og rajgræsser
- ✓ Stærk synergi i blanding med Boxer[®]



Figur 1: Bekæmpelse af græsukrudt i vinterhvede om efteråret. uddrag (pre-lim) fra forsøg 091982626-003 og 002. Behandlinger udført i stadie 11.

Pico[®] indeholder aktivstoffet picolinafen og er et kombineret blad- og jordmiddel, der optages via ukrudtets blade, kimstængel og rødder. Picolinafen tilhører gruppen af pyridin-carboxamider og har samme virkningsmekanisme som diflufenican. Effektmæssigt ligger de tæt på hinanden, men Pico[®] er stærkere mod agerrævehale.

I blanding med Boxer[®] opnås synergi mod især agerrævehale og rajgræsser. Pico[®] bekæmper desuden fuglegræs, burresnerre, hyrdetaske, ærenpris, stedmoderblomst, rød tvetand, spildraps og lugtløs kamille.

i Produktinformation

Aktivt stof: 75 % picolinafen

Formulering: WG (vandopløseligt granulat)

Godkendelse: Vintersæd, efterår og forår

Behandlingsfrist: 90 dage

Dosering: 133 g/ha = 1 BHI (100 g aktivstof)

Emballage: 500 g

Afstandskrav: min. 20 m til vandmiljø, 2 m til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

Anvendelse: Pico[®] må anvendes én gang per sæson, enten efterår eller forår

BASF
We create chemistry

Pico[®] 750 WG

Anvendelse og dosering

- Efterårsbrug i vintersæd, stadie 11–12
- Vinterhvede: 40–50 g/ha mod bredbladet ukrudt, 80 g/ha mod græsukrudt
- Vinterbyg, vinterrug og vintertriticale: anvendes solo
- Kun i vinterhvede bør Pico[®] blandes med Boxer[®]

Råd til skånsom behandling

- Sådybde 4–5 cm
- Udsæt behandling ved udsigt til kraftig regn
- Øg evt. udsædsmængden 15–20 %
- Placeret/samsået fosfor ved såning giver robust etablering

Strategier i vinterhvede 2026

Almindelig bestand af bredbladet ukrudt inkl. enårig rapgræs og vindaks:

→ 1–1,5 l/ha Boxer[®] + **40–80 g/ha Pico[®]*** (højeste dosering mod græsukrudt)

+ Rajgræsser, agerrævehale og væselhale (inkl. ALS- og ACCase-resistent):

→ 1. behandling — sortjord senest 24 timer efter såning: 1–1,5 l/ha Boxer[®] + 0,05–0,08 l/ha DFF[®]*

→ 2. behandling — stadie 11–12: 1–1,5 l/ha Adimax[®] + **80 g/ha Pico[®]***

* Tag højde for Boxer[®] "vej" og tilsæt ikke spredklæbemiddel eller olie, da det kan give afgrødeskade.

OBS! Frarådes at blande og anvende i strategi med aclonifen-produkter på grund af risiko for afgrødeskade.

NB! Ved lavere dosering end de 40–50 g/ha skal der ikke forventes tilfredsstillende effekt mod bredbladet ukrudt samt græsukrudt.

Kontakt

 **Anders Christensen**
+45 25 23 35 53

 **Jakob Skodborg Jensen**
+45 40 16 81 63

 **Thomas Ory Nielsen**
+45 42 13 49 45

 www.agro.basf.dk

 <https://www.facebook.com/BASFagriculturalSolutionsDK>

 https://youtube.com/@Follow_a_Farmer

 **BASF**

We create chemistry

Adimax[®] og Boxer[®] er registrerede varemærker tilhørende Syngenta. DFF[®] er et registreret varemærke tilhørende Bayer Crop Science.

DFF[®] må anvendes indtil 1. december 2026, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarsels-sætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Oplysninger opdateret pr. 29.06.2026