STRATEGIER 2026



BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS

BASF
We create chemistry

Follow a Farmer

Videoserien, der giver indblik i hverdagen hos landmænd i Danmark, Sverige og Finland.

Vi vender tilbage med sæson 5 i 2026, hvor vi skal følge nye og inspirerende landmænd.

Stay tuned!

HOURS 105K WATCHED!



ABONNER HER

BASF
We create chemistry

Følg med på YouTube og www.agro.basf.dk/da/follow-a-farmer/

Det danske rådgivningsteam ved BASF



Anders R. Christensen

Agronomy Manager, BASF
Agricultural Solutions Nordics

+45 25 23 35 53

anders.christensen@basf.com



Thomas Ory Nielsen

Agronomy Manager, BASF
Agricultural Solutions Nordics

+45 42 13 49 45

thomas.ory@basf.com



Jakob Skodborg Jensen

Agronomy Manager, BASF
Agricultural Solutions Nordics

+45 40 16 81 63

jakob.skodborg-jensen
@basf.com



Forårsstrategier i korn




BASF
We create chemistry

Effekter mod brunrust i hvede 2024

AU Flakkebjerg, 24329 (n=2).


Uddrag tabel 4, s. 17 Applied crop Protection 2024, st. 32-33 og 51-55




Lang virketid med F500® - holdige produkter

Markforsøg i vinterhvede udført i **Frankrig, Tyskland og Polen** i perioden 2015–2018 (n = 4).
En enkelt behandling i BBCH 37–41. Ubehandlet kontrol: 34 % angrebsgrad af brunrust.

% effekt mod brunrust 20–30 dage efter behandling




% effekt mod brunrust 40–50 dage efter behandling



F500® (pyraclostrobin) i T3 hvede for højeste udbytte?

Forsøget viser, at kombinationen Propulse 1,0 + Comet Pro 0,375 opnår det største nettomerudbytte sammenlignet med både Propulse 1,0 alene og Propulse 1,0 + Folicur Xpert 0,25.

Denne løsning giver en tydelig fordel i forhold til udbytteoptimering, uden at tælle med i triazolregnskabet. Tilføjelse af Comet Pro i T3 er en effektiv strategi for at maksimere udbyttet i hvede.



Tæller ikke med i triazolregnskabet

Merudbytte hkg/ha. for kontrol af septoria i hvede. Uddrag Flakkebjerg 9 forsøg 2020-2022 - behandlet st. 45-51 LSD 3,6 - T1 behandlet med 0,35 Prosaro, eller Proline 0,2 l/ha (20325/21325/22325)

Mod.e. Århus Universitet, Applied Crop Protection 2022, Disease control in wheat

AARHUS UNIVERSITY
DCA - DANISH CENTRE FOR FOOD AND AGRICULTURE

Landsforsøgsserie 090862424 – Sønderborg. Sort Pondus. Ubehandlet: Brunrust 0,4 pct. Septoria 20 pct




1x F500®
T1: -
T2: 0.75 Balaya®
T3: 0.5 Propulse

2x F500®
T1: -
T2: 0.75 Balaya®
T3: 0.3 Pictor Active + 0.2 Propulse

3x F500®
T1: 0.3 Comet Pro® + 0.2 Proline
T2: 0.75 Balaya®
T3: 0.3 Pictor Active® + 0.2 Propulse

Pictor® Active T3 i hvede

Serie 090862424 – 5 forsøg- ”svampebekæmpelse i delt aksbehandling i vinterhvede” ,
Pre-lim data.(3 forsøg med signifikant forskel)



Serie 090862424 – Sønderborg. Sort Pondus
Ubehandlet: Brunrust 0,4 pct. Septoria 20 pct.



T2:
0,75 Balaya®

T3:
0,3 Pictor® Active
+ 0,2 Propulse



T2:
0,75 Balaya®

T3:
0,5 Propulse

Pictor® Active i T3 hvede

Landsforsøgsserie 090862424 "Svampebekæmpelse i delt aksbehandling i vinterhvede",
5 forsøg, Pre-lim data. (3 forsøg med signifikant forskel)

Forsøg: 003 & 005 - **SEPTORIA**

Ubeh	73,43 hkg/ha (c)	
0,5 l Propulse	79,7 hkg/ha (ab)	**+2,5 hkg**
0,3 l Pictor Active® + 0,2 l Propulse	82,2 hkg/ha (a)	

Forsøg: 002 & 006 - **BRUNRUST OG SEPTORIA**


Ubeh	86,84 hkg/ha (e)	
0,5 l Propulse	101,56 hkg/ha (bcd)	**+4,7 hkg**
0,3 l Pictor Active® + 0,2 l Propulse	106,21 hkg/ha (ab)	

Forsøg: 004 - **BRUNRUST**

Ubeh	73,5 hkg/ha (f)	
0,5 l Propulse	94,8 hkg/ha (d)	**+6,2 hkg**
0,3 l Pictor Active® + 0,2 l Propulse	101,1 hkg/ha (b)	

Pictor Active® T3 hvede, AU Flakkebjerg

AU Flakkebjerg, uddrag af forsøgsserie 24326, 3 forsøg,
T1 0,2 Proline og T2: 0,75 Balaya



Propulse, Proline, Folicur Xpert = registreret varemærke tilhørende Bayer Crop Science
Greteg Star = registreret varemærke tilhørende Syngenta

AARHUS UNIVERSITY
DCA - DANISH CENTRE FOR FOOD AND AGRICULTURE

Strategi i hvede

Svampebekæmpelse

Strategi i hvede 2026

- St. 32
  - **Comet® Pro** + triazol
- St. 39 (Faneblad)
  - 0,75 – 1,0 l **Balaya®**
- St. 55-61 (Skridning)
  - 0,3 l **Pictor® Active**
    + 0,2 l Propulse

Strategi i hvede 2027

- St. 32
  - **Comet® Pro**
    + triazol **(uændret)**
- St. 39 (Faneblad)
  - 0,75 – 1,0 l **Pictor® Active**
    + triazol
- St. 55-61 (Skridning)
  - 0,3 l **Pictor® Active**
    + triazol

Det anbefales ikke at anvende produkter indeholdende en strobilurin mere end 2 gange per sæson



Svampemiddel

AFSLUT STÆRKT!

GRØNNERE AFGRØDER INDTIL HØST ! STØRRE UDBYTTE !




STÆRK T3 VIRKELIG STÆRK

Pictor® Active

Strategi i hvedens T3:
0,3 l/ha Pictor Active +
0,2 l/ha Propulse:

- Effektiv mod septoria og brunrust
- +570 kr/ha I merudbytte*
- Ingen triazol begræsning
- Bedste langtidseffekt overfor brunrust





Propulse er et registreret produkt fra Bayer Crop Science

*090862424 - Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbehandling, led 9 versus led 8, hvedepris 140 kr/hkg

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Medlem af CropLife Danmark.


PRODUKTINFO OG VEJLEDNING

BASF
We create chemistry

Svampebekæmpelse i vårbyg 2024


AU Flakkebjerg,

N=2, 24384 uddrag. ubeh. 49,5 hkg/ha behandlet st. 37



2025 Merudbytte hkg/ha

AU Flakkebjerg, N=2, 25384 ubeh. 76,4 hkg/ha behandlet st. 43



Propulse, Prosaro = registreret varemærke tilhørende Bayer Crop Science
Soratel = registreret varemærke Adama

Strategi i byg

Svampebekæmpelse

Strategi 2026

- St. 31-32
  - **Comet® Pro**
    + triazol
- St. 39-48
  - **Pictor® Active**
    + triazol

Strategi 2027

- St. 31-32
  - **Comet® Pro**
    + triazol
- St. 39-48
  - **Pictor® Active**
    + triazol

Det anbefales ikke at anvende produkter indeholdende en strobilurin mere end 2 gange per sæson




Forårsstrategier i raps




BASF
We create chemistry

Effekt af Caryx forår



**”Lejesæd kan reducere udbyttet med op til 50%,
primært ved at reducere lysnedtrængningen til de nedre sideskud/skulper”**
kilde: HGCA, UK

Kraftigere forgrening og fyldigt grønnere skulpelag



Caryx anbefaling forårsbehandling

- **ca 15-30 cm forårsvækst** St. 39-48
- **Raps i god vækst:** 8-10 C om dagen, let morgenfrost er ok
- **Dosering: 0,5-0,7 l/ha:** Tilpasses såtidspunkt, sort, planteantal, kvælstoftildeling mv



Behandlet med Caryx i forår

Architect®

Udnyt rapsens fulde potentiale




BASF
We create chemistry

Architect® produktprofil

Svampe og vækstreguleringsmiddel til vinterraps efterår og forår	
Aktivstoffer	100 g/l pyraclostrobin 150 g/l mepiquat-chlorid 25 g/l prohexadion-calcium
Formulering	Suspensionsemulsion (SE)
Doseringer	Efterår: 1-2 l/ha Architect® + AMS (BBCH 13-20) Forår: 1-2 l/ha Architect® + AMS (BBCH 21 -59)
Emballage	10 Liter Architect®
Bemærkninger	Architect® + AMS

Svampemiddel



Effektiv bekæmpelse af

Lys bladplet & phoma


Vækstregulering



Undgå

Udvintring & Lejesæd

Fysiologi



Opnå større

Robusthed



ANNONCE



Architect® – et nyt kombineret svampe- og vækstreguleringsmiddel til vinterraps

Sundere stængel og ny standard for bekæmpelse af lys bladplet*. Kontrol af væksten så lejesæd minimeres for lettere høst og højere udbytte.

** Danske forsøg i 2024 viste +2,7 hkg/ha ved 1,0 l/ha midt i marts.*

Hvorfor er Architect vigtig?

Mildere vintre og fugtige forår giver lys bladplet (LLS) gode betingelser for hurtig spredning i vinterraps. Samtidig betyder lejesæd besværlig høst, øget spild og tidsforbrug. Architect løser begge udfordringer i én overkørsel. Midlet beskytter mod LLS og vækstregulerer for en lettere høst.

Stærkeste bekæmpelse af lys bladplet


Architect har sin største styrke mod LLS. I Landsforsøgene 2024 gav 1,0 l/ha anvendt midt i marts et merudbytte på +2,7 hkg/ha. I Storbritannien er LLS den vigtigste sygdom i raps, og der ses i mange år omfattende og kraftige angreb.

LLS opfører sig i høj grad som Septoria i hvede. Smitten spredes med regnstænk og kan danne mange generationer gennem vækstsæsonen. Sygdommen starter allerede i efteråret, hvor bekæmpelse sjældent er nødvendig. Er den til stede om foråret og ikke under kontrol, bevæger den sig op i afgrøden med nedbør og kan til sidst angribe skulperne. Det kan give store udbyttetab på grund af opspring af skulper.

Architect har ligeledes god effekt mod Phoma, som bekæmpes bedst i efteråret. I tyske forsøg er der desuden vist en ikke ubetydelig sideeffekt mod kransskimmel, hvor der er behandlet både efterår og forår.

Vækstregulering og plantesundhed i én overkørsel

Om foråret reducerer Architect strækningsvæksten, styrker rapsstænglen og mindsker dermed risikoen for lejesæd.



Landsforsøg 2024, Uddrag 090062424

Architect stimulerer også rodvæksten og fremmer udviklingen af lavere sideskud, som vokser op i lyset, blomstrer og sætter skulper. Endelig understøtter Architect plantens fysiologi for sundere stængler. Alle disse forhold er velkendte gevinster, der kan øge udbyttet.

Architect - sådan får du fordel af det

BASF anbefaler Caryx som primært vækstreguleringsmiddel i efteråret. Architect kan anvendes efterfølgende, hvis der er Phoma, LLS eller behov for yderligere vækstregulering. I foråret bør Architect bruges som det primære middel ved vækststart. Eventuelt sammen med en lavere dosis Caryx, hvor risikoen for lejesæd er højere.

Architect er godkendt til 1–2 l/ha i stadie 13–20 i efteråret samt 1–2 l/ha i foråret i stadie 21–59. For at opnå den bedst mulige vækstregulerende effekt bør der tilsættes ammoniumsulfat (AMS).

***»Hvis du vil sikre et bedre udbytte i år, så kør 1,0 l/ha Architect + 0,5 l/ha AMS ved vækststart. Så holder du vinterrapsen sund og stående til høst«,** siger Agronomy Manager Anders Christensen, BASF.*

»Der er hjemtaget så meget Architect, at landmændenes efterspørgsel i foråret 2026 kan imødekommes«, siger Anders Ravn Nielsen.

Spørgsmål? Kontakt os:



BASF anbefaling for vinterraps 2026

Efterår, stadie 14–15:
- 0,5 – 0,7 l/ha Caryx

Opfølgning i efterår ved Phoma, LLS eller behov for ekstra vækstregulering:
- 1,0 l/ha Architect + 0,5 l/ha AMS

Ammoniumsulfat sikrer aktivering af vækstreguleringen.

Forår, ved vækststart, stadie 21 (må anvendes indtil stadie 59):
- 1,0 l/ha Architect + 0,5 l/ha AMS

Til LLS bekæmpelse og vækstregulering.

Tilføj 0,25 l/ha Caryx, hvis risikoen for lejesæd er høj.




Egeskov forsøgsmark 2025 - Architect®





Bekæmpelse af lys bladplet

Uddrag: 090062424 - Bekæmpelse af lys bladplet i vinterraps, n=2
Beregnet 11.9.2024 – tabel K4






Alt behandlet i blomst med landmandens løsning. Begge forsøg behandlet 18. marts 2024 i rapsens stadie 50.
Architect tilsamt 0,5 l AMS

Tidlig svampebekæmpelse i raps


Uddrag n=3, 090092424, LSD: 212,4 hkg std., table K5



St. 32	Ubehandlet	Ubehandlet	1 l Architect®
Blomst	Ubehandlet	0,5 l Pictor® Active + 0,2 l Propulse	0,5 l Pictor® Active + 0,2 l Propulse

Svampebekæmpelse i vinterraps


Uddrag af landsforsøgsserie 090092020, 090092021 og 090092022,
n=12, LSD: 72,92 kg, ubeh. std. udbytte: 4.694 kg/ha, angivet som FHT, foreløbigt data.



Propulse = reg. varemærke tilhørende Bayer Crop Science
Tazer / Orius Gold = reg. varemærke tilhørende Nufarm
*tilsat 0,1 % NIS (Agropol/Contact)

Svampebekæmpelse i blomst

Landsforsøg 2025, tabel 7, s. 157.



SDHI-midler

	Amistar (azoxy)	Amistar Gold/ Gretec Star (azoxy +difeno)	Folicur Xpert (tebu+ prothio)	Juventus (met)	Maxentis (azoxy+ prothio)	Orius Gold (tebu)	Pictor Active (pyraclo+ boscalid)	Propulse (fluopyram +prothio)	Prosaro (tebu+ prothio)	Soratel (prothio)	Zenby (isofetamid)
Knoldbægersvamp	**(*)	**(*)	***	***	***(*)	***	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Gråskimmel	**	-	**	**	**	**	**	**	*(*)	-	-
Skulpesvamp	***	-	**	**	**(*)	**	***	***	**	**	-
Lys bladplet	-	-	**	**(*)	**(*)	**	***	**(*)	**(*)	***	-
Normaldosering	1	1	0,78	1	1	0,96	1	1	0,75	0,7	0,8
BBCH	60-69	60-69	30-69	15-19+65	60-69	60-69	60-69	57-69	30-69	50-73	60-65

Strategi i foråret

St. 32-50: Architect 1,0 l/ha* / Caryx 0,7 l/ha

St. 63-65: Pictor Active 0,5 l/ha + prothio 0,2 l/ha**

St. 69: Pictor Active 0,5 l/ha**

* Tilsæt ammoniumsulfat.
** Tilsæt spredeklæbemiddel

Pictor® Active

Svampemiddel til Raps

Tag sygdomsbekæmpelsen til et nyt niveau

...og Høst det sorte guld

I Landsforsøgene i raps har Pictor Active givet den mest effektive svampebekæmpelse, og specifikt mod lys bladplet er Pictor Active det absolut stærkeste produkt. Det gør Pictor Active til Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel i raps. Strategier med Pictor Active giver mulighed for splitbehandling samt højere udbytte og dækningsbidrag end øvrige svampeløsninger i raps.

Sygdomme	Pictor® Active
Knoldbægersvamp	★★★(★)
Skulpesvamp	★★★
Lys bladplet	★★★

★★★ = middel til god effekt
★★★★ = meget god effekt
(★) = en halv stjerne

Tabel 7 side 157, uddrag, Landsforsøgene 2025



BASF
We create chemistry

LÆS MERE

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Medlem af CropLife Danmark.


Pico® 750 WG
- en god erstatning for DFF
BASF
We create chemistry


Pico® – en god erstatning for DFF

Aktivstof: 75% Picolinafen
Formulering: WG (vandopløseligt granulat)
Godkendelse: Vintersæd efterår og forår
Behandlingsfrist: 90 dage
Dosering: 133 g/ha = 1 BHI (100 g aktivstof)
Emballage: 200 g

- Picolinafen (blad/jordmiddel ~ 50/50*) optages via ukrudtets blade, kimstængel og rødder.
- Pico kan anvendes i vintersæd
  - Efterår i stadie 10-11 på fugtig jord - Typisk dosering 33 g/ha.
  - Foråret når væksten er igang i stadie 25-29. Op til 133 g/ha.
- Pico er en oplagt blandingspartner til Stomp, Boxer, Atlantis OD, Mangan, Rexade, Ally, Express mm.
- Pico er regnfast 1 time efter udsprøjtning.
- Ingen restriktioner med hensyn til efterfølgende afgrøde eller omsåning.
- Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljø og 2 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer.

*afhængig af klimatiske forhold


Bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vinterhvede i efteråret, uddrag fra landsforsøgsserie 091972626, n=3



Uddrag af effektprofil fra Planteværn Online, der viser beregnet ukrudtseffekt (%) for herbicidet Pico 750 WG i hvede (vinter, ingen udlæg). Data omfatter relevante ukrudtsarter ved forskellige doser og vækststadier (0–2 blade) under danske forhold.

	Beregnet effekt (%) ved fire doser				Effektmål (%) Anbefalet					Beregnet dosis (g/ha) ved valgt effektmål				
	g /ha				planter/m²					planter/m²				
Ukrudtsarter	**33**	**67**	**133**	**(266)**	**1**	**10**	**40**	**150**	**...**	**1**	**10**	**40**	**150**	**...**
Burresnerre	58	89	98	100	70	75	75	90	95	41	45	45	68	91
Fuglegræs	93	99	100	100	0	75	75	85	90		19	19	24	29
Fuglegræs ALS-res	93	99	100	100	95	95	95	96	97	39	39	39	43	48
Fuglegræs SU-res	93	99	100	100	95	95	95	96	97	39	39	39	43	48
Kamille, lugtløs	76	95	99	100	0	75	85	90	95		33	42	50	67
Kamille, lugtløs ALS-res	76	95	99	100	95	95	95	96	97	67	67	67	73	82
Kamille, lugtløs SU-res	76	95	99	100	95	95	95	96	97	67	67	67	73	82
Stedmoder, ager	94	99	100	100	0	75	80	85	95		18	20	23	36
Tvetand	85	97	100	100	0	0	0	75	85				26	33
AErenpris, mark	74	94	99	100	0	0	65	70	75			28	31	34
AErenpris, storkronet	74	94	99	100	0	0	65	70	75			28	31	34
AErenpris, vedbend	65	92	99	100	0	0	65	70	75			33	36	40

Bemærk
Anvendelse af doser, som overskrider normaldoseringen (røde tal eller (tal i parentes)) er ikke tilladt!
Læs altid etiketten!



Focus® Ultra

- for effektiv bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt (inkl. ALS/SU resistent)

BASF
We create chemistry

Effekt af Focus® Ultra
Styrkeprøve: Agil vs. Focus Ultra mod rajgræs

Internt BASF-forsøg, Tølløse, 1. maj 2025



Agil 100 EC - 1,0 l/ha
Dobbelt dosering ifht. FU !

Focus® Ultra - 1,0 l/ha

Internt BASF-forsøg, Tølløse, 5. juni 2025




Agil 100 EC - 1,0 l/ha
Dobbelt dosering ifht. FU !

Focus® Ultra - 1,0 l/ha


Effekt af Focus® Ultra i forskellige doseringer mod græsukrudt

Resultater fra interne BASF forsøg i Europa



Husk DASH til Focus® Ultra

Forsøg i vårbyg sprøjtet på "spildkornsstadiet" ved Gefion (VKST), Focus Ultra alene samt med tilsætning af henholdsvis Dash, olie og Lissapol.



Spildkorn og græsser i vinterraps?

Ukrudtsmiddel

Focus® Ultra - Tar det hele

- Må anvendes i split
- Samme produkt mod spildkorn og græsser
- Bekæmper effektivt græsser* og ALS resistent rajgræs
- Anvendes altid sammen med 0,5 l/ha Dash

1. beh.
0,75 l/ha mod
spildkorn og græsser

2. beh. 0,75-1 l/ha
mod spildkorn og
græsser



PRODUKTINFO
OG VEJLEDNING

BASF
We create chemistry

*Ingen eller lav effekt mod enårig rapgræs, væselhale, rødsvingel og stivbladet svingel.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Medlem af CropLife Danmark.

Svampebekæmpelse i roer 2026




BASF
We create chemistry

Comet® Pro - det stærkeste svampemiddel i roer!

Uddrag fra BASF Ringerunde 3 2025, december 2025

Antal svampebehandlinger i sukkerroer 2025 (n=51)



Middelvalg og dosering I sukkerroer 2025 (n=51)

	Amistar® Gold	Comet® Pro	Proline® (minor use)
1. behandling n=51	43% (0,33 l/ha)	100% (0,3 l/ha)	27% (0,325 l/ha)
2. behandling n=49	45% (0,31 l/ha)	98% (0,29 l/ha)	43% (0,52 l/ha)
3. behandling n=31	83% (0,4 l/ha)	10% (0,27 l/ha)	45% (0,34 l/ha)

Amistar Gold = registreret varemærke tilhørende Syngenta Nordics A/S
Proline = registreret varemærke tilhørende Bayer Crop Science

Comet® Pro - det stærkeste svampemiddel i roer!

- Regulær godkendelse til sukker-, foder- og energiroer
- Enkelt behandling af 0,625 l/ha eller i split af 2 x 0,31 l/ha

Sygdomme	Comet® Pro 200 g/l pyraclostrobin Maks. 2 behandlinger a 0,31 ltr	Amistar Gold 125g/l difenoconazol + 125 g/l azoxystrobin Maks. 2 behandlinger a 0,5 ltr	Proline (Minor use) 250 g/l prothioconazol Maks. 2 behandlinger a 0,5 ltr
Bedemeldug	****	****	***(*)
Bederust	****	***(*)	***(*)
Ramularia	****	****	***(*)
Cercospora	**(*)	***	****
Normaldosering, L/ha.	0,625	1,0	1,0
Pris pr. normaldosering inkl. afgifter, eksl. moms	259 kr	320 kr	422 kr

Amistar Gold = registreret varemærke tilhørende Syngenta Nordics A/S
Proline = registreret varemærke tilhørende Bayer Crop Science
Landsforsøgene 2025, Uddrag af Tabel 8



Comet® Pro - det stærkeste svampemiddel i roer

Strategi i roer 2026

1. behandling

- 0,31 l/ha
  Comet® Pro

2. behandling

- 0,31 l/ha
  Comet® Pro

3. behandling

(ved sen optagning -oktober og frem)

- 0,5 l/ha
  Amistar Gold

Tip: Tilsæt Proline i T1 og T2 for bedre effekt mod Cercospora

Amistar Gold = registreret varemærke tilhørende Syngenta Nordics A/S Proline = registreret varemærke tilhørende Bayer Crop Science

Comet® Pro


Svampemiddel

Bedste valg - højt merudbytte

- Bedre plantesundhed
- Ekstra sukker
- Højere dækningsbidrag

Over 3600 kr netto pr. ha med 2x0,3 l/ha Comet Pro

Gns. af 3 år (2022-2024; n=8)







PRODUKTINFO OG VEJLEDNING

BASF
We create chemistry

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Medlem af CropLife Danmark.
Armistar Gold reg. varemærke Syngenta.



Vizura®

Nitrifikationsinhibitor til gylle i alle afgrøder

BASF
We create chemistry


Vizura®

Nitrifikation af ammonium til nitrat

Kvælstof gødning gylle/biogas

Nitrifikation af ca 80% af ammoniumen ved forskellige jordtemperaturer

Virkningstid ved forskellige jordtemperaturer



Ved lave jordtemperaturer (5 °C) bliver ammonium omdannet til nitrat på ca 6 uger. Vizura® forlænger denne periode betydeligt til omkring 10-14 uger.

Nitrosaminbakterierne arbejder, når jordtemperaturen kommer over 5°C – hastigheden accelererer med stigningen i temperaturen

Planterne optager ammonium lettere ved lave temperaturer. Ved højere temperaturer (over 12°C) optages nitrat lettere, men det er først efter Sankt Hans.

Anvendelse af Vizura®

Doseringsanlæg



Doseres direkte i gyllen ved påfyldning af gyllevognen, den mest præcise metode.

Gylletanken



Hældes direkte i tanken, kræver at den tømmes helt og at doseringen er ens for alle arealer.

Udsprøjtning



Sprøjtes ud maks 24 timer før udbrining af gylle, 100 l/ha vand.






Sådan virker Vizura
- og derfor gavner det både dig og dine afgrøder

Hvad er Vizura? Hvordan virker det? Hvad får man ud af det, og hvordan anvendes det i praksis? Her får du svar på de mest stillede spørgsmål om nitrifikationshæmmeren Vizura.

Hvad er Vizura?
Vizura er en effektiv nitrifikationshæmmer, som stabiliserer udnyttelsen af det kvælstof, organiske gødningstyper indeholder. Vizura, tilsat fx gylle ved udbringning, er designet til midlertidigt at bedøve de jordbakterier, der omdanner gyllens ammoniumkvælstof til nitratkvælstof. Eksempel herpå er alle typer af gylle, staldgødning og biogasdigestat.

Hvad betyder Vizura for kvælstofudnyttelsen i marken?
Vizura mindsker risikoen for tab af kvælstof i form af nitratkvælstof til vandmiljøet. Dine afgrøder får således optimale betingelser for at kunne optage mest muligt af det kvælstof, den tildelte gylle indeholder. Effekten af Vizura består bl.a. i, at afgrøden får frigivet nitratkvælstof successivt hen over vækstsæsonen, hvilket giver en mere jævn og kontrolleret vækst af afgrøden.
I regnfulde perioder vil risikoen for udvaskning af nitratkvælstof eller denitrifikation af frit kvælstof herved blive stærkt begrænset. Udbytterne på især sand- og mellemjordene stiger derfor normalt, når gylle iblandes Vizura. De største udbyttestigninger ses derfor oftest i majs, vårbyg og kartofler på jorde fra JB1 til JB3.

Hvordan påvirker Vizura fosforoptag og lattergasudledning?
En yderligere gevinst er, at Vizura forbedrer planternes optag af fosfor, da jorden omkring rodnettet forsures, og planterne dermed stimuleres til at optage mere fosfor.
Når jordbakterierne omdanner ammonium til nitrat, er et af affaldsprodukterne lattergas (N_2O), som er en kraftig klimagas. Tilsættes Vizura gyllen eller udsprøjtes på arealet inden gylleudbringning, udsættes processen med omdannelse af ammonium, og udledningen af lattergas på markniveau sænkes.
I skrivende stund er der ikke nogen afregning for reduktion af lattergas (N_2O), men både i forhold til en kommende CO_2-afgift og fremtidige klimakrav fra aftagerne af landbrugsprodukter er forventningen, at der også kommer til at være et økonomisk udbytte at hente på det punkt.



Hvordan kan jeg tilføre Vizura?
Vizura kan tilføres jorden på tre måder:
- Ved brug af doseringsanlæg på gyllevognen tilsættes Vizura, mens gyllevognen fyldes for at sikre en god opblanding.
- Opblanding direkte i gylletanken, når hele tanken skal tømmes, og gyllen anvendes med ha-dosering. Vizura forbliver aktiv i gyllen i op til 6 uger.
- Ved udbringning med marksprøjte anbefales det at foretage behandlingen 24 timer før udbringning af gylle med minimum 100 liter vand pr. hektar. Ønskes en efterafgrøde samtidigt nedvisnet, kan Vizura iblandes glyfosat.



Thomas Ory Nielsen
Agronomy Manager, BASF
42 13 49 45

Doseringen afhænger ikke af gylle- eller kvælstofmængden, men derimod af markens areal. Vizura doseres altid med samme dosering
- derfor altid 2 liter/ha Vizura.

Skader Vizura jordens bakterieflora?
Nej. Alle de studier, der er lavet fra Aarhus Universitet, viser, at Vizura ikke har nogen negative effekter på regnorme eller andre nyttedyr.
Da Vizura kun i en periode bedøver de nitrificerende bakterier, opretholdes populationen af nitrificerende bakterier uændret i jorden efterfølgende.

Hvor kan jeg købe Vizura?
Du kan købe Vizura hos din lokale DLG-forhandler.



STØRRE UDBYTTER STARTER MED EN BEDRE PLAN

KONTAKT OS I DAG FOR EN SECOND OPINION



Thomas Ory
42 13 49 45

Jakob Skodborg
40 16 81 63

Anders Christensen
25 23 35 53

PICTOR® ACTIVE • COMET® PRO • VIZURA® • TERPAL®
MEDAX® TOP • ARCHITECT® • FOCUS® ULTRA • CARYX®

BASF
We create chemistry

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.